



Program dolistnego dokarmiania BURAKÓW CUKROWYCH


NANOkoloidy
Ag oraz **Cu** zawarte
 w **Sol-Vit Mn Cu Nano Premium**,
 w znacznym stopniu ograniczają rozwój
 patogenów chorobotwórczych,
 jednocześnie dostarczając składniki
 pokarmowe: **Miedź i Mangan**

Uwaga: w przypadku
 występowania niskich
 temperatur, dodatkowo
 zastosować:

**Sol-Vit amino
 BURAK
 5 kg/ha**
**Sol-Vit BorCynk
 2 kg/ha**
**Sol-Vit FOSFon
 2 L/ha**

**Sol-Vit NPK
 21:21:21
 4 kg/ha**
**Sol-Vit BORon
 2 kg/ha**
**Sol-Vit CuMn
 NANO *
 1 L/ha**

**Sol-Vit amino
 BURAK
 5 kg/ha**
**Sol-Vit BORon
 2 kg/ha**
**Sol-Vit Mn-17
 amino
 0,5 kg/ha**



**4-8 liści
 dobrze rozwiniętych**

**10-12 liści
 dobrze rozwiniętych**

przed zakryciem międzyrzędzi

Zalecane dawki na 1 ha używając 200-300 litrów cieczy roboczej. Program można modyfikować w/g indywidualnych potrzeb w poszczególnych fazach rozwojowych, warunków uprawowych oraz odmian.

Wykonanie zabiegów dolistnych zaleca się przy wilgotności powietrza 50-80%, temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować w czasie intensywnego słońca oraz silnego wiatru.

Ciecz roboczą przygotować bezpośrednio przed stosowaniem, użyć w ciągu kilku godzin od momentu sporządzenia.

Do poszczególnych zabiegów można
 dodawać azot w formie **mocznika**.

UWAGA!

Mocznik rozpuszczać jako pierwszy.